

AGROFINA



KATRIN 80

Imazapir 80% (SP)



CON SOLO 100 g/Ha CONTROLÁS TODAS LAS MALEZAS.





**KATRIN 80** es un herbicida sistémico para uso pre- y post-emergente de las malezas con acción residual y de control, utilizado en cultivos de caña de azúcar y girasol tolerantes a las imidazolinonas, así como en pre-plantación de pino taeda. Una vez aplicado, las malezas detienen su desarrollo, ocurriendo la muerte de aquellas luego de 3 a 4 semanas.

**VENTAJAS:** EL herbicida selectivo para Girasoles IMI. • Una sola aplicación en post-emergencia temprana con acción residual. • Amplio espectro de control | Excelente efecto prolongado.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** Inhibidor de la enzima acetolactato sintasa (ALS). Grupo B.

**ACCIÓN:** Sistémico, residual.

**FAMILIA QUÍMICA:** Imidazolinonas (ALS).

**PRESENTACIÓN:** Pack: 1 Kg Katrin 80 + 5 L Zinax

**CULTIVOS:** Girasol tolerante a imidazolinonas, Pino taeda, Caña de azúcar.

**MALEZAS:** Abrojo chico, Abrojo grande, Albahaca silvestre, Ambay, Amor seco, Bananita, Cebadilla del campo, Chamico, Charrua, Chinchilla, Cola de zorro, Enredadera perenne, Flor de San Juan, Fumo bravo, Gramilla, Horquetera, Lecherón, Malva cimarrona, Maria mola, Matacampo, Mocopavo, Ortiga gigante, Paitén, Pasto bandera, Pasto de cuaresma, Pasto jesuita, Pasto yacaré, Pata de gallina, Peludilla, Quinoa, Roseta, Sanguinaria, Setaria, Tartago, Yuquery.

**Control Parcial de:** Apio cimarrón, Cebollín, Chufa, Enredadera anual, Gramón y Sorgo de Alepo.

**RECOMENDACIONES DE USO:** **Girasol:** No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando las malezas presenten síntomas de marchitez. Usar solamente en girasol tolerante a las imidazolinonas. Aplicación en post-emergencia temprana del cultivo y de las malezas. **Pino Taeda:** Se debe aplicar en pre-plantación. Preparar el terreno procurando una baja cantidad de rastrojo y restos leñosos que interfieran en la aplicación; en el caso de uso de rastra, dejarlo libre de terrones y grandes desniveles, aplicar el producto con maleza emergida y dejar transcurrir entre la aplicación del producto y la plantación del cultivo un período de 15 a 30 días.

**DOSIS RECOMENDADAS:** **Girasol:** 0,1 Kg/ha. **Caña de azúcar:** 0,6 kg/ha. **Pino Taeda:** 0,5 kg/ha.

**ORDEN DE MEZCLA:** WG → WP → SG → SP → SC → OD → EC → SL

**Tecnologías para producir más y mejor.**

Consultá con el Distribuidor de la **RED AGROFINA** más cercano a Tu zona



**AGROFINA**  
INTELIGENCIA PRODUCTIVA