

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase III. Producto ligeramente peligroso. Categoría inhalatoria III – (Cuidado)

Irritación cutánea: Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Irritación ocular: Moderado irritante ocular (Cuidado) Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL.

Grupo químico: Metoxiacrilato + triazol + carboxamida. Antídoto: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobreexposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN:

• **TODD EL PAÍS:** TASS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) 0800-888-TOXI (8694) • **CAPITAL FEDERAL:** Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Unidad de Toxicología. Tel: (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Clínicas. Dpto. Toxicología. Tel: (011) 5950-8804/6 • **BUENOS AIRES:** Policlínico "Prof. A. Posadas". Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). (011) 4654-6648 / 4658-7777 • **PERGAMINO:** Hospital Interzonal de Aguados San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259 • **CÓRDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. • **MENDOZA:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. • **CHACO:** Hospital "J.C. Peraldo". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. • **NEUQUÉN:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

GENERALIDADES: FORMAX III es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en cultivos de maní y soja, compuesto por 3 principios activos de diferentes modos de acción. Por un lado, se combina la destacada acción preventiva y antiesporulante de azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, con el efecto curativo y erradicante de cyproconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. El tercer componente, Boscalid, es una carboxamida, de acción sistémica local y que se transloca translaminares. De esta manera, se logra tener una herramienta para el manejo de resistencias, con un producto que además amplía el espectro de control.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. - Colocar agua limpia en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen y hacer funcionar el sistema de retorno. - Agréguese la dosis de ZINAX primero y luego la de **FORMAX III** directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente. - Completar el volumen remanente de agua. Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar **FORMAX III** dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: FORMAX III debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm² sobre las hojas del cultivo a proteger.

Aplicación terrestre: Puede aplicarse con equipos terrestres, de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 150 L/ha, y presión superior a 4,8 bar (70 lb/pg²), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.

Aplicación aérea: Volumen mínimo de agua a emplear: 15 L/ha, dependiendo del cultivo. NO deben realizarse aplicaciones con gasoil.

12/2019/08/08

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de aplicación
MANÍ	Viruela tardía (<i>Cercosporidium personatum</i>)	1,1 L/ha + 0,5 L/ha de ZINAX (EMAG 75% EC)*	Realizar la primera aplicación con la aparición de los primeros síntomas y repetir en caso de ser necesario a los 21 días.
	Viruela temprana (<i>Cercospora arachidicola</i>)		
SOJA	Mancha marrón de la soja (<i>Septoria glycines</i>)	0,75 L/ha + 0,5 L/ha de ZINAX (EMAG 75% EC)*	Aplicar preventivamente o ante los primeros síntomas, desde R1 (principios de floración) hasta R5.8 (80% de llenado de granos). Los mejores resultados se logran con el uso preventivo.

*EMAG (Ésteres metílicos de ácidos grasos).

RESTRICCIONES DE USO: No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos mayor que 10 km/hora. **Rotación de cultivos:** Los activos se degradan rápidamente en el ambiente, asegurando que no existan efectos negativos sobre la germinación y el establecimiento de cultivos sucesivos en la rotación. **Reingreso al área tratada:** Esperar 24 horas para permitir el secado del asperjado sobre el cultivo antes de reingresar al mismo. **Periodo de carencia:** Dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: **Maní:** 50 días y **soja:** 30 días

"En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."

COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los productos para la protección de cultivos, de reacción neutra. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física. Tener en cuenta siempre el orden de adición de productos: **WG → WP → SG → SP → SC → OD → EC → SL**

FITOTOXICIDAD: No manifiesta síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

RESISTENCIA: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción son usados repetidamente para controlar las mismas enfermedades en la misma zona, puede ocurrir la aparición de cepas resistentes que pueden sobrevivir, propagarse y volverse dominantes en esa zona.

AVISO: AGROFINA S.A., al no poder prever la posible aparición de resistencia, no asume ninguna responsabilidad por daño o pérdida, como resultado de falta de efectividad del producto ante cepas resistentes. Prácticas tales como el uso alternado de fungicidas de distinto modo de acción, evitan o demoran la proliferación organismos resistentes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"



FormaxIII_BIDON5Lt_24/02/2023



PANTONE 356



PANTONE 186



PANTONE 1505



PANTONE 293



NEGRO



FORMAX III

FUNGICIDA

GRUPO 11

GRUPO 7

GRUPO 3

Suspensión Concentrada (SC)

Apto para maní y soja

Composición

azoxistrobina: [E]-2-[2-[6-(2-cianofenoxy)pirimidin-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato de metilo	5,62 g
boscalid: 2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il)nicotinamida	6 g
cyproconazole: (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol	3 g

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Inscripto en SENASA con el N° 39.313

NOTA: Agrofin S.A. no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera de control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. **Agrofin S.A.** garantiza la calidad de **Formax III** y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo de la luz solar.

Fecha de Vencimiento y Lote: Ver Envase

Registrado por:

AGROFINA

Joaquín V. González 4977, (C1419AYK) CABA | Argentina
Tel.: 54 11 4501.6800
agrofinas@agrofinas.com.ar | www.agrofinas.com.ar

NO INFLAMABLE
Agítese bien antes de usar
INDUSTRIA ARGENTINA
Contenido neto: 5 Litros

CUIDADO

