

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:** Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. Irritación dérmica: Leve irritante dérmica (CUIDADO) Categoría IV. Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos. Clase inhalatoria III - CUIDADO Grupo químico: Difeniléter. Antídoto: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** Mareos, pérdida del conocimiento, dificultad respiratoria, trastornos digestivos, vómitos. Irritación en mucosas, piel y ojos. Contactos prolongados pueden causar descamación de piel. Sin ventilación adecuada los vapores inhalados pueden causar irritación, náuseas, mareos o dolores de cabeza.

**CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN: TODO EL PAÍS:** TAS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) Tel.: (0341-4480077 / 4242727 ó 0800-888-TOXI (8694). • **CAPITAL FEDERAL:** Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Unidad de Toxicología. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247 - Hospital de Clínicas. Dpto. Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804 / 06. • **BUENOS AIRES:** Policlínico "Prof. A. Posadas". Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. • **PERGAMINO:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. • **CÓRDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. • **MENDOZA:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. • **CHACO:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (0372) 42-5050/7233 / 44-2399. • **NEUQUÉN:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

**GENERALIDADES:** MILLION es un herbicida postemergente de contacto, selectivo para los cultivos de soja y maní, que controla malezas latifoliadas. Cuando es absorbido por las partes verdes de las malezas se activa por la luz, destruyendo la membrana celular, lo que produce una necrosis de los tejidos vegetales. Comienza a actuar a la 1/2 hora de ser aplicado.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:** 1) Llenar el tanque del equipo hasta las 3/4 partes de su capacidad con agua limpia (utilizar filtros). 2) Poner en funcionamiento el sistema de retorno o agitación y agregar la cantidad recomendada de MILLION al tanque. 3) Completar la carga de agua en el tanque. Es importante que el sistema de retorno o agitación funcione en todo momento.

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Equipos terrestres:** Se recomienda la utilización de pastillas tipo abanico plano preferentemente con ángulos de 80 ó 110 grados, una presión de 40-60 lb/pg<sup>2</sup> y un volumen de 120-150 L/ha para lograr una cobertura completa y uniforme. **Equipos aéreos:** Se recomienda una presión máxima de 40 lb/pg<sup>2</sup> y un caudal mínimo de 20 L/ha. El ancho del trabajo deberá asegurar una adecuada cobertura.

**Nº de gotas:** 30-40 gotas/cm<sup>2</sup>.

**RESTRICCIONES DE USO: Períodos de carencia:** Soja: 90 días. Maní: 40 días. Pulverizar formando una cobertura completa y uniforme sobre las malezas. No aplicar cuando las malezas excedan el tamaño indicado y/o se encuentren recubiertas de polvo o tierra que impidan su completo mojado. No aplicar bajo condiciones de sequía o en casos de falta de humedad prolongada y/o baja humedad relativa ambiente. Las malezas y el cultivo deben encontrarse en activo crecimiento y con buena humedad del suelo. No aplicar en horas del día de máxima insolación y alta temperatura. Esta no debe superar mayores que 30° C. No aplicar en presencia de rocío, ni ante la inminencia de lluvias. No obstante, lluvias ocurridas luego de 30 minutos de la aplicación, no afectan su eficacia, ya que la absorción del producto es muy rápida. No aplicar con vientos superiores a 7 km/hora. Evitar la deriva sobre cultivos sensibles. **Tiempo de reingreso al área tratada:** No entrar al área tratada hasta que la pulverización se haya secado sobre el follaje (24 horas).

"En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas, pero incompatible con aquellos que tienen reacción alcalina. NO mezclar con graminicidas, ni aceites vegetales o minerales. Se debe respetar un intervalo mínimo de 5 días entre la aplicación de lactofen y los graminicidas postemergentes. En soja puede usarse en mezcla de tanque con herbicidas para hoja ancha como imazetapir, clorimuron o flumetsulam.

Antes de utilizar en mezcla con otros productos, se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Tener en cuenta siempre el orden de adición de productos: VIG → WP → SG → SP → SC → OD → EC → SL

**FITOTOXICIDAD:** En el cultivo de soja, bajo ciertas condiciones (altas dosis, poco desarrollo del cultivo, estrés hídrico) puede evidenciarse un leve bronceado de las hojas, que no afecta al desarrollo posterior del cultivo.

C21/00/00/00/00

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
MANÍ	Chamico ( <i>Datura ferox</i> ) Chinchilla ( <i>Tagetes minuta</i> ) Flor de Santa Lucía ( <i>Commelina erecta</i> ) Malva cimarrona ( <i>Anoda cristata</i> ) Nabo ( <i>Brassica campestris</i> ) Yuyo colorado ( <i>Amaranthus quitensis</i> )	350 cm <sup>3</sup> x ha	El cultivo de maní debe presentar al menos 5 hojas verdaderas.
	Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> )	250 cm <sup>3</sup> x ha	
SOJA	Albahaca silvestre ( <i>Galinsoga parviflora</i> ) Alkekenje ( <i>Physalis angulata</i> ) Chamico ( <i>Datura ferox</i> ) Chinchilla ( <i>Tagetes minuta</i> ) Farolito ( <i>Nicandra physaloides</i> ) Flor de Santa Lucía ( <i>Commelina erecta</i> ) Malva cimarrona ( <i>Anoda cristata</i> ) Nabo ( <i>Brassica campestris</i> ) Yuyo colorado ( <i>Amaranthus quitensis</i> ) Yuyo colorado resistente a ALS ( <i>Amaranthus quitensis</i> )	350 cm <sup>3</sup> x ha	Para ser usado sólo o en mezcla para control temprano de malezas en un estadio de desarrollo entre 1 y 6 hojas.  El cultivo de soja debe presentar 2 a 3 hojas trifoliadas.  Para Chinchilla ( <i>Tagetes minuta</i> ) se recomienda en mezcla con 30 g/ha de VRILEC. (Clorimuron etil 25% WP).
	Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> )	250 cm <sup>3</sup> x ha	

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**



MILLION\_5L\_09/01/2023



PANTONE 347



PANTONE 384



PANTONE 186



PANTONE BLACK



**MILLION**

**HERBICIDA**  
GRUPO 14

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Composición**

lactofen: O-[5-(2-cloro-, -, trifluoro-p-toliloxi)-2-nitrobenzoil]-DL-lactato de etilo ..... 24,0 g  
emulsionantes y solvente c.s.p ..... 100 ml

Fecha de Vencimiento y Lote: Ver Envase

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.** Inscripto en SENASA con el Nº 38.041

**NOTA: Agrofina S.A.** no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera de control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. **Agrofina S.A.** garantiza la calidad de **MILLION** y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo de la luz solar.

**INFLAMABLE 3ª CATEGORÍA**

**INDUSTRIA ARGENTINA**  
**Contenido neto: 5 Litros**

Registrado por:  
**AGROFINA**  
Joaquín V. González 4977, (C1419AYK) CABA | Argentina  
Tel.: 54 11 4501.6800  
agrofinas@agrofinas.com.ar | www.agrofinas.com.ar

**CUIDADO**

