

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE III. LIGERAMENTE PELIGROSO. Categoría inhalatoria: II (NOCIVO). Grupo químico: 2,6-dinitroanilina. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) Categoría IV.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobreexposición laboral o ingesta voluntaria del producto. Puede ocasionar irritación de mucosas, piel y ojos. Si es ingerido en grandes cantidades puede ocasionar metahemoglobinemia y efectos sobre el SNC, hígado y riñón.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN: TODO EL PAÍS: TAS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) Tel.: (0341-4480077 / 4242727 ó 0800-888-TOXI (8694). • **CAPITAL FEDERAL:** Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". Unidad de Toxicología. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247 - Hospital de Clínicas. Dpto. Toxicología. Tel.: (011) 5950-8804 / 06. • **BUENOS AIRES:** Policlínico "Prof. A. Posadas", Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. • **PERGAMINO:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. • **CÓRDOBA:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. • **MENDOZA:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. • **CHACO:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. • **SALTA:** Hospital del Niño. Servicio de Toxicología. Tel.: (0387) 421-3954 (Int. 115) / 431-0277. • **NEUQUÉN:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

GENERALIDADES: Fungicida de contacto, con efecto preventivo y acción multisitio. Inhibe el crecimiento del micelio del hongo y su desarrollo reproductivo. Por sus características, resiste al lavado por la lluvia, formando una capa protectora sobre el follaje tratado, con larga acción residual. **INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACION: Agítese bien antes de usar.** Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua limpia y filtrada. El producto se vierte directamente al tanque de la máquina pulverizadora, ya cargada con agua, y se agita hasta completar la homogeneización. Cuando se recomienda adicionar aceite a la pulverización, deberá emplearse un aceite emulsionable no fitotóxico de alta calidad y de tipo "liviano" (viscosidad no mayor de 60 a 70 segundos Saybolt). Este deberá incorporarse al tanque en último término, una vez que se haya logrado la suspensión de NIFRAN.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Pulverización terrestre: Cultivo de mani y poroto: usar un caudal no menor de 150 L/ha. Emplear pastillas de tipo cono hueco, trabajar con presiones de entre 60 y 70 lbs/pulg². **Cultivo de papa:** usar un caudal no menor de 400 L/ha. Emplear pastillas de tipo cono hueco, trabajar con presiones de entre 60 y 70 lbs/pulg². **Pulverización de vides:** emplear equipos de alto caudal, preferentemente tipo turbina. **Pulverización aérea:** No se recomienda la aplicación aérea.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Maní	Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	1000 ml/ha	Dos aplicaciones: comenzar al inicio del clavado, y repetir a los 21 días, durante el llenado de frutos
Poroto	Sclerotinia (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	750-1000 ml/ha	Aplicar al inicio y al fin de la floración.
Papa	Tizón tardío de la papa (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 - 600 ml/ha	Aplicar 20 a 30 días después de la emergencia del cultivo. Repetir cada 7 días.
Vid	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	800 ml/ha	Cuatro aplicaciones: en floración, en cierre de racimo, en envero y finalmente en madurez

02/10/60 10A

RESTRICCIONES DE USO:

Producto	Período de carencia
Maní	21 días
Papa	10 días
Poroto	14 días
Vid	28 días

"En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia."

Rotación de cultivos: Sin restricciones. **Reingreso al área tratada:** Esperar 24 horas para permitir el secado del asperjado sobre el cultivo antes de re-ingresar al mismo. **COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas, excepto aquellos de reacción fuertemente alcalina, como el polisulfuro de calcio o caldo bordelés. No debe aplicarse junto o en secuencia con Abamectina. En caso de duda, efectuar siempre un ensayo previo a pequeña escala.

Tener en cuenta siempre el orden de adición de los productos: WG → WP → SG → SP → SC → OD → EC → SL

FITOTOXICIDAD: En caso de mezclas o aplicación secuencial con Abamectina, puede ocurrir fitotoxicidad.

RESISTENCIA: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción son usados repetidamente para controlar las mismas enfermedades en la misma zona, puede ocurrir la aparición de cepas resistentes que pueden sobrevivir, propagarse y volverse dominantes en esa zona. La posibilidad de desarrollo de cepas de hongos resistentes a Fluzinam podría ocasionar falta de efectividad y, consecuente-mente, disminución del rendimiento de los cultivos.

AVISO: AGROFINA S.A., al no poder prever la posible aparición de resistencia, no asume ninguna responsabilidad por daño o pérdida, como resultado de falta de efectividad del producto ante cepas resistentes. Prácticas tales como el uso alternado de fungicidas de distinto modo de acción, evitan o demoran la proliferación organismos resistentes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"



NIFRAN_5LITA_09/01/2023



PANTONE 356



PANTONE 384



PANTONE 186



PANTONE 294



NEGRO



NIFRAN

FUNGICIDA
GRUPO 29

Suspensión Concentrada (SC)

Apto para mani, papa, poroto, vid

Composición

fluazinam: 3-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidina 50 g
coadyuvantes y vehículo c.s.p. 100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Inscripto en SENASA con el N° 35.461

NOTA: Agrofina S.A. no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera de control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. **Agrofina S.A.** garantiza la calidad de NIFRAN y su estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados y al resguardo de la luz solar.

Fecha de Vencimiento y Lote: Ver Envase

Registrado por:
AGROFINA
Joaquín V. González 4977, (C1419AYK) CABA | Argentina
Tel.: 54 11 4501.6800
agrofinas@agrofinas.com.ar | www.agrofinas.com.ar

NO INFLAMABLE
Agítese bien antes de usar
INDUSTRIA ARGENTINA
Contenido neto: 5 Litros

CUIDADO

