

Imazapir 17,5% + Imazapic 52,5% (SP)













TOP GROUND es un herbicida con elevada residualidad y amplio espectro para aplicaciones pre-emergentes y post-emergentes tempranas de MAÍZ y SORGO IMI, barbechos largos en SOJA y aplicaciones pre emergentes en CAÑA DE AZÚCAR. TOP GROUND es un herbicida con acción de contacto, sistémico y residual. Estas caraecterísticas le permiten controlar malezas en pre-emergencia como en post-emergencia garantizando un período de control prolongado y sin competencia.

VENTAJAS EN LA APLICACIÓN DE TOP GROUND:

- Elevada residualidad, más de 90 días.
- Amplio espectro de control en latifoliadas y gramíneas.
- Alta eficacia de control sobre rye grass y malezas difíciles.
- Rápida translocación por Floema y Xilema a los tejidos meristemáticos de la malezas con pronta detención de crecimiento y muerte a las pocas semanas.
- Uso apto para soja con y sin técnología STS y para maíces IMI.

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibidor de la enzima ALS.

FAMILIA QUÍMICA: Imidazolinonas.


PRESENTACIÓN: 1 Pack 2,28 Kg (4 sobre de aluminio c/u con 5 sobres hidrosolubles) + 10 L Zinax (EMAG 75 %).

BANDA TOXICOLÓGICA: Verde.

ORDEN DE MEZCLA: WP \rightarrow WG \rightarrow SP \rightarrow SG \rightarrow SC \rightarrow OD \rightarrow EC \rightarrow SL

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO DE MAÍZ Y SORGO IMI (tolerante a imidazolinonas).



Excelente control residual y de nacimientos de Rama negra, manteniendo el lote libre de malezas por mucho tiempo.

APLICACIÓN PARA BARBECHO QUÍMICO LARGO EN SOJA



Excelente control de Rye grass resistente, Rama negra, Parietaria, Viola, ente otras malezas de otoño e invierno. Elevada residualidad.

Tecnologías para producir más y mejor.



